

## Consignes d'utilisation des comprimés d'iode dosés à 65 mg

Veuillez lire attentivement l'intégralité de ce document avant de prendre un comprimé d'iode

En cas d'accident nucléaire, des rejets d'iode radioactif dans l'air peuvent se produire. Les comprimés d'iode stable (iodure de potassium) protègent la glande thyroïde contre les effets de l'iode radioactif, pendant 24 heures.

### QUAND ?





Pour être efficaces les comprimés d'iode doivent être pris au bon moment.

**Absorber les comprimés d'iode UNIQUEMENT SUR ORDRE DU PREFET**

(relayé par radio, TV, véhicules avec haut-parleur...)

### COMMENT ?

Dissoudre les comprimés d'iode dans une boisson, ou les avaler directement, **en 1 prise**.

|   |  |
|---|--|
|    | <b>Adulte (y compris femmes enceintes et allaitant) et enfants de plus de 12 ans :</b><br>2 comprimés d'iode |
|   | <b>Enfant de 3 à 12 ans :</b><br>1 comprimé d'iode   |
|  | <b>Enfant de 1 mois à 3 ans :</b><br>1/2 comprimé d'iode   |
|  | <b>Enfant de moins de 1 mois :</b><br>1/4 de comprimé d'iode   |

Après dissolution du comprimé d'iode dans une boisson (eau, lait, jus de fruits), la solution obtenue ne peut être conservée et doit être prise immédiatement. Cette dissolution permet de diminuer le goût métallique.

|   |   |
|---|---|
| <b>Contre-indications</b>                     | <i>En dehors d'une allergie connue et de quelques pathologies immunologiques préexistantes rarissimes (dermatites herpétiformes ou vascularites hypo complémentaires), il n'y a pas de contre-indications à l'administration d'iodure de potassium.</i>   |
| <b>Précautions d'emploi</b>                   | <i>Si vous avez eu une réaction antérieure lors d'une injection d'un produit iodé de contraste radiologique, de l'emploi d'un antiseptique à base d'iode sur la peau, ou de la consommation de poissons, de crustacés ou de mollusques, ainsi que chez les sujets porteurs de goîtres anciens, un avis médical est souhaitable avant la prise de comprimés d'iode.<br/>Il est recommandé que les femmes enceintes ou allaitant, les nourrissons et enfants de moins de un an, les personnes ayant un antécédent ou une pathologie thyroïdienne en cours, consultent un médecin après la prise de comprimés d'iode, dès que la situation le permettra.</i> |
| <b>Interactions avec d'autres médicaments</b> | <i>Si vous devez prendre un médicament antiacide, vous devez différer la prise de ce médicament d'au moins deux heures après la prise d'iode, car il peut réduire l'efficacité de l'iode.</i>   |
| <b>Effets indésirables</b>                    | <i>Il peut exceptionnellement être observé des effets indésirables, notamment : poussées de fièvre, douleurs articulaires, éruptions cutanées transitoires et spontanément régressives, réactions allergiques (œdème, trouble respiratoire).<br/>En cas de manifestation d'effets indésirables, demandez un avis médical.</i>   |

### AUTRES ACTIONS DE PROTECTION

D'autres actions de protection contre les risques liés aux rejets radioactifs pourront être prescrites par le préfet :

- La mise à l'abri et à l'écoute des médias à l'intérieur d'un bâtiment en dur, en fermant les portes et les fenêtres et en arrêtant les ventilations mécaniques.
- L'évacuation, en fonction de l'importance des rejets et de l'évolution de la situation.

**Dans tous les cas, vous devez garder les comprimés d'iode à portée de main.**